

I N H A L T

von Bd. VI

| | Seite |
|---|-------|
| Einleitung | 7 |
| 14. Stamm: Stachelhäuter (<i>Echinodermata</i>) | 8 |
| A. Allgemeiner Teil | 8 |
| B. Systematischer Teil | 41 |
| 1. Das natürliche System der Stachelhäuter | 41 |
| 2. Überblick über das System | 42 |
| 1. Unterstamm: <i>Pelmatozoa</i> , Gestielte Stachelhäuter. | 42 |
| 1. Klasse: <i>Crinoidea</i> , Haarsterne, Seelilien | 42 |
| 2. Unterstamm: <i>Eleutherozoa</i> , Ungestielte Stachelhäuter | 46 |
| 2. Klasse: <i>Holothurioidea</i> , Seewalzen, Seegurken .. | 46 |
| 3. Klasse: <i>Astroidea</i> , Seesterne | 52 |
| 4. Klasse: <i>Ophiuroidae</i> , Schlangensterne | 56 |
| 5. Klasse: <i>Echinoidea</i> , Seeigel | 60 |
| 15. Stamm: Tentakulaten, Kranzfühler (<i>Tentaculata</i>) | 70 |
| 1. Klasse: <i>Phoronidea</i> , Hufeisenwürmer | 70 |
| 2. Klasse: <i>Bryozoa (Ectoprocta)</i> , Moostiere | 72 |
| 3. Klasse: <i>Brachiopoda</i> , Armfüßler | 80 |
| 16. Stamm: Binnenatmer (<i>Enteropneusta</i>) | 86 |
| 1. Klasse: <i>Helminthomorpha</i> , Eichelwürmer | 87 |
| 2. Klasse: <i>Pterobranchia</i> , Flügelkiemer | 90 |
| 3. Klasse: <i>Pogonophora</i> , Bartrräger | 93 |
| 17. Stamm: Pfeilwürmer, Borstenkiefer (<i>Chaethognatha</i>) | 94 |
| Literatur | 95 |
| Namen- und Sachverzeichnis | 97 |

