

Cum Synopsis nostra Generum plantarum mycetoidearum, p. XLVII— CXII, iam typis mandata esset, ad manus venerunt novissimi labores Friesii, viri de Mycologia longe meritissimi, quo suavissimi Amici nostri dono, vel ad calcem huius opusculi, ad explendam Synopsin nostram non uti, nefas ducebamus, etiamsi certi simus, fore, ut mox edito Systemate suo mycologico, literato orbi iam per aliquod tempus desideratissimo, et nostras, quas hic offerimus, symbolas, et aliorum forsitan in scopum eundem curas posteriores, expleat celeberrimus Vir quin tradat oblivioni.

Ultra quadraginta Genera nova, a Cl. Friesio constituta, invenies in libris, qui sequuntur:

Kongl. Vetenskaps Acad. nya Handl.

1816 — 19.

Symbolae Gasteromycorum, ad illustrandam Floram Succicam. Fasc. I. Lundae 1817.

Novitiae Florae Suecicae. Pars V.
Continuatio. Lundae. MDCCCXIX.

Scleromyceti Sueciae. Decas V— XIV.
Lundae. 1820.

Ex his, quae l. c. clarius exponuntur, nunc indicanda sunt.

p. XLVII. 1 A. *Roestelia* Link. Adde: (Cancel-laria Dec.)

p. XLIX. 7 — 8 *Septaria* Fries (Novit. V.)
Sporidia cylindrica, septata, pellucida, instrata. — (Stilbospora Uredo Dec.)

- p. L. 14 - 15. *Psilonia Fries* (Novit. V) —
Est *Tubercularia Buxi* Dec., quae
forte *Illosporio* generi adscribi pos-
set.
- ib. 20 - 21. *Sclerococcum Fries* (Novit.
V.) Sporidia globosa, non septata,
inter se et cum stromate tenui in tu-
berculum arcte conglutinata.
- ib. 21 - 22. *Crinium Fries* (Novit. V.)
Sporidia in stromatis erecti cylin-
drici cornei intus floccoso - fistulosi
apice capitulo gelatinoso immersa. —
(*Acrosporium calyciiforme* Fr.
Obs. II. p. 311.)
- ib. 23 - 24. *Rhizostroma Fries* (Novit. V.)
Sporidia stromatis pinnatim repen-
tis ramosi lanuginosi intus stuppei
apicibus dilatatis inspersa. Tubercula
homogenea, stromati innata. — (*Rhi-
zomorpha Xylostroma* et *corti-
cata*.)
- p. LII. 34 e. *Anthina Fries* (Novit. V. -
Ceratonematis species Roth. Catal.)
Flocci in massam membranaceam car-
nosam ramulosam apice flocculosam
concreti. — „Est *Merisma* ascis de-
stitutum.“ Fr. l. c.
- — f. *Leiostroma Fries* (Novit. V.)
Flocci denique concresecunt in cuti-

eulam expansam, superficie glabra. — „Est Thelephora (Stereum p. Cl. 179.) ascis nullis.“

- p. LVI. 58 - 59. *Clissosporium* Fries (Novit. V.) Flocci moniliformes Sporidia in vesicula globosa sessili apice rum-pente et mitrata inclusa. — „Est Torula vesicula Ascophorae.“ Fr. l. c.

- p. LVIII. 67 - 68. *Herpotrichum* Fries. (Novit. V.) Flocci simplices, reptantes, articulati, articulis longitudinaliter plicatis. *)

- ib. 69 - 70. *Dendrina* Fries (Novit. V.) Flocci radiatim expansi, continui, persistentes. — Species, huc relatae, sunt „Byssocladia aspora.“ Fr. l. c.

- p. LX. 78 - 79. *Plegmatium* Fries (Novit. V.) — „Est Racodium, fibris septatis.“ Fr. l. c.

- ib. 80 - 81. *Oncidium* N. ab E. (Kunze u. Schmidt Myc. H. ined.) Flocci ramosi, intricati, hinc inde conglomerati, apicibus emergentibus crassis uncinatis. Sporidia globosa, cum floccis conglomerata.

- ib. 81. *Campsotrichum* Ehrenb. Adde: (Rignotrichum Kunze in litt.)

- p. LXV. 104 - 5. *Perichaena* Fries (Symb. Gasterom. p. 11.) Sporangium mem-

*) De *Synaphia* genere vide Corrigenda ad calcem.

branaceum, circumscissum. Sporidia coacervata. Flocci parci, intexti. — (*Licea strobilina* Alb. Schw., *Lic. circumscissa* P., aliae.)

p. LXXVII. 115 - 16. *Diachea Fries* (Nov. V.)

Sporangium membranaceum, rumpens. Sporidia libera. Flocci reticulati, stipite perforati. — (*Stemonitis elegans* Trentep.)

p. LXXI. 134-35. *Myriococcum Fries* (Sclerom. Suec. Dec. VII. N. 70.)

Sporangium membranaceo-furfuraceum, superne evanescens. Sporangiola copiosa, polyspora. Sporidia conglobata. — *Myr. praecox* Fr. l. c. est veluti *Spumaria* inter *Angioglasteres*.

p. LXXII. *Pisocarpium*. Adde: *Pisomyces Fries* (Symb. Gasterom.)

ib. 137 - 38. *Nidularia Fries* (Symb. Gasterom.)

Sporangium rotundatum, apice rumpens, cavum. Peridiola libera, in fundo nidulantia, (lenticularia). — *Cyathus farctus* Roth. Cat. et al.

p. LXXV. 148 - 49. *Anixia Fries* (Novit. V.)

Carnosa, intus demum cava apiceque dehiscens. Sporidia massae internae succulentae immersa.) — (Spec. nova: *A. nemoralis*; *difformis*, *alba*.)

- p. LXXVI. 150-51. *Rhizopogon Fries* (Symb. Gasterom. p. 5.) Cortex firmus, fibrarum barba radicans, apice rumpens. Sporangiola in massa carnea uniformi sparsa, (primo pulposa.)- Sp. Rhizop. luteolum Fr.
- p. LXXVI. 154-55. Forte medio hoc loco ponendum esset genus *Sparassis* Fries (Novit. V.), nobis incognitum.
- p. LXXIX. 163. Asterophorae characterita ampliandus: Hymenium laeve vel lamellosum. (Fries. Symb. Gasterom.)
- p. CII. 181-82. *Spadonia Fries* (Novit. V.) Batt. t. 40. f. A. E.- Character genericus desideratur.
- p. CV. 190. *Shizoderma* Ehrenb. Adde: *Ectostroma* Fries (Novit. V.)
- p. CVI. 196. *Cytospora* Ehrenb. Adde: *Bostrichia* Fries (*Vet. Acad. Handl.* — *Scl. Suec. Decas VIII-XI.* 109.)
- ib. 198. *Placuntium* Ehrenb. Adde: *Rhytisma* Fries (*Vet. Acad. Handl.* — *Scl. Suec. Dec. XIV.* 133-135.)
- ib. 198-99. *Excipula* Fries (*Vet. Acad. Handl.* — *Sclerom. Suec. Dec. VIII.*) Perithecium orbiculare, dehiscendo cupulaeforme, ore circulari. Asci discoidales, erecti, fixi. — (*Peziza strigosa* Fr. - *Lecidea asserculorum* Ach., al.)

- p. CVII. 199. *Stegia* Fries. Nomen generis in *Eustegia* mutandum, ob *Stegiam* Dec., inter plantas phaenogamas recensitam.
- p. CVIII. 205 - 6. *Cenangium* Fries (Vet. Acad. Handl.— Sclerom. Suec. Dec. XII.) Perithecia basi solida (saepe stipiti-formia), apice subinania, clausa. Asci erecti, fixi. — (*Sphaeria fallax* Pers., *Sph. Aucupariae* Pers., al.)
- p. CIX. 206 - 7. *Dothidea* Fries (Sclerom. Suec. Dec. XII.) Perithecia (libera vel) stromati immersa, ostiolo punctiformi. Asci in fundo erecti, fixi.
- Adnot. *Dothidea*, pristinum genus (p. LXXIV.), deleatur maximam partem, quippe quod aliorum quorundam generum primordia tantum colligat.
- p. CIX. 208. *Sphaeria*.
- Adnot. Genus *Phoma* Fries (Novit. V.) — *Sph. Pustula* Pers.) novo caractere hic citandum.
- p. CXII ad calcem. *Ecchinae* Fries et *Spilocaeae* Fries (Novit. V.), novis generibus, in Novit. V. obiter indicatis, locum inter reliqua certum assignare nequivimus.
-

Beschreibung
der
um Halifax wachsenden
P I L Z E,

enthaltend

241 Pilzarten in 900 Figuren,
auf 182 Kupfertafeln,

alle von dem Verfasser nach der Natur gemahlt, gestochen und colorirt,
mit einer ausführlichen Beschreibung jeder Art nach allen ihren Entwick-
lungszuständen, mit Angabe der Zeit, wann sie gesammelt wurde, des
Bodens und Standorts, der Dauer und der besondern Wohnörter der
neuen und seltenen Arten; auf reine mehr als zwanzigjährige
Beobachtungen gegründet

v o n

James Bolton,

Mitglied der Naturforschenden Gesellschaft in Edinburg.

Natura semper eadem!

Aus dem Englischen mit Anmerkungen

v o n

Carl Ludwig Willdenow.

Fortgesetzt und mit einer Einleitung und einer erklärenden
Übersicht sämmtlicher Tafeln versehen

v o n

Dr. Ch. G. Nees von Esenbeck

u n d

Dr. Th. Fr. Ludw. Nees von Esenbeck.



Berlin,
B e y G. R e i m e r.
1 8 2 0.

