Eine theoretische Interpretation der gegenseitigen Wechselwirkungsparameter in den ^{29}Si -NMR-Verschiebungen

A Theoretical Interpretation
of Mutual Interaction Parameters
for ^{29}Si NMR Chemical Shifts

R. RADEGLIA

Zentralinstitut für physikalische Chemie der Akademie
der Wissenschaften der DDR, Berlin-Adlershof

(Z. Naturforsch. **32b**, 1091-1092 [1977]; eingegangen am 25. März 1977)

Pairwise Interaction Parameters, ^{29}Si NMR,
Chemical Shift, Quantum Chemical Interpretation

The description of substituent dependence
of ^{29}Si NMR chemical shifts by means of
pairwise interaction parameters is inter-
preted with a simple quantumchemical model
theoretically.

Die ^{29}Si -NMR-chemischen Verschiebungen kön-
nen nicht durch ein Schema additiver Substituenten-
inkremente dargestellt werden¹. Auf der Grundlage
einfacher quantenchemischer Modellvorstellun-
gen²⁻⁴, die auch durch halbempirische Allvalenz-
elektronenberechnungen bestätigt werden konn-
ten⁵⁻⁶, ist es dagegen möglich, die Substituenten-
abhängigkeit der ^{29}Si -chemischen Verschiebungen
halbquantitativ zu beschreiben.

VONGEHR und MARSMANN⁷ haben kürzlich ein
empirisches Schema vorgeschlagen, das die Be-
schreibung der ^{29}Si -chemischen Verschiebung durch
Parameter η_{ij} gestattet, welche die Wechselwirkung
zwischen den Substituenten i und j am Siliciumatom
symbolisieren. Es gilt:

$$\delta = \sum_{i>j} \sum \eta_{ij} \quad (1)$$

wobei die Doppelsumme über die sechs Tetraeder-
kanten läuft. Im folgenden soll gezeigt werden, daß
dieses Schema der Wechselwirkungsparameter⁷ und
die quantenchemischen Modellvorstellungen²⁻⁴ ein-
ander äquivalent sind, womit sich zugleich die
Möglichkeit der theoretischen Interpretation der
 η_{ij} -Parameter ergibt.

Wenn die Polarität der Bindung zwischen dem
Siliciumatom und dem Substituent i durch

$$h_i = 1,0 - 0,16 (EN_i - EN_{\text{Si}}) + 0,035 (EN_i - EN_{\text{Si}})^2 \quad (2)$$

charakterisiert wird⁸ (EN ist die Elektronegativi-
tät), kann eine reduzierte Abschirmungskonstante
 σ^* berechnet werden^{2,3}, die der chemischen Ver-

Sonderdruckanforderungen an Dr. R. RADEGLIA,
Akademie der Wissenschaften der DDR, Zentral-
institut für physikalische Chemie, Rudower Chaussee 5,
DDR-1199 Berlin-Adlershof.

schiebung δ proportional ist. Es gilt $\sigma^* = R^* P^*$
mit³:

$$P^* = \frac{1}{2} \sum_i h_i - \frac{1}{6} \sum_{i>j} h_i h_j \quad (3)$$

$$R^* = \left[1 + \frac{0,35 f}{Z} (4 - \sum_i h_i) \right]^3 \quad (4)$$

wobei die Bedeutung des Reduktionsfaktors f und
der effektiven Kernladungszahl Z des Siliciums in
Lit.^{2-4,6} erläutert wurde. Einfache Umformungen
der Gln. (3) und (4) ergeben

$$P^* = 1 - \frac{1}{6} \sum_{i>j} (1 - h_i) (1 - h_j) \quad (5)$$

$$R^* = \left\{ 1 + \frac{0,35 f}{3 Z} \sum_{i>j} [(1 - h_i) + (1 - h_j)] \right\}^3 \quad (6)$$

Näherungsweise folgt wegen $|1 - h_i| \ll 1$ aus Gl. (6):

$$R^* \cong 1 + \frac{0,35 f}{Z} \sum_{i>j} [(1 - h_i) + (1 - h_j)] \quad (7)$$

Wenn Gl. (5) mit (7) multipliziert wird und wieder
Glieder höherer Ordnung vernachlässigt werden,
erhält man:

Abbildung. Die Wechselwirkungsparameter η_{ij} nach
Lit.⁷ als Funktion der berechneten Produkte der
Bindungsparameter $-g_i g_j$.
Substituenten i und j :

1: CH_3, CH_3	10: $\text{C}_6\text{H}_5, \text{Cl}$
2: $\text{CH}_3, \text{C}_6\text{H}_5$	11: $\text{C}_6\text{H}_5, \text{H}$
3: $\text{CH}_3, \text{CH}=\text{CH}_2$	12: F, F
4: CH_3, F	13: F, Cl
5: CH_3, Cl	14: Cl, Cl
6: CH_3, H	15: Cl, H
7: $\text{C}_6\text{H}_5, \text{C}_6\text{H}_5$	16: H, H
8: $\text{CH}=\text{CH}_2, \text{CH}=\text{CH}_2$	17: F, H
9: $\text{C}_6\text{H}_5, \text{F}$	

$$\sigma^* \cong 1 - \frac{1}{6} \sum_{i>j} \sum_{i>j} \quad (8)$$

$$\left\{ (1 - h_i)(1 - h_j) - \frac{2,1 f}{Z} [(1 - h_i) + (1 - h_j)] \right\}$$

Nach einigen Umformungen ergibt sich aus Gl. (8) eine Größe, die ebenfalls der chemischen Verschiebung δ proportional ist:

$$6(\sigma^* - 1) - \left(\frac{2,1 f}{Z} \right)^2 = - \sum_{i>j} \sum_{i>j} g_i g_j \quad (9)$$

mit

$$g_i = h_i + \frac{2,1 f}{Z} - 1 \quad (10)$$

Der Vergleich der Beziehungen (1) und (9) zeigt, daß die in Lit.⁷ empirisch bestimmten Parameter der paarweisen Wechselwirkung η_{ij} den Produkten $-g_i g_j$ bis auf eine additive Konstante proportional sein sollten. Wir haben für die in Lit.⁷ angegebenen Substituenten (außer für Br und I, da für diese elektronenreichen Atome das einfache quantenchemische Modell versagt^{2,3}) mit den Werten $f = 0,2135$, $Z = 4,15$ und den üblichen Elektronegativitätswerten ($EN_{Si} = 1,90$)² die in der Tab. angegebenen Bindungsparameter h_i und g_i berechnet. In der Abb. ist der Vergleich zwischen dem empirischen η_{ij} ⁷ (unter Angabe der Fehlerbreite) und den berechneten $-g_i g_j$ -Werten dargestellt. Es zeigt sich

Tabelle. Bindungsparameter für Si-i.

i	EN _i	h _i	g _i
CH ₃	2,6	0,905	0,0132
C ₆ H ₅ , CH=CH ₂	2,7	0,894	0,0024
F	3,93	0,819	-0,0725
Cl	3,15	0,855	-0,0373
H	2,2	0,955	0,0632

eine lineare Korrelation. Nur für $i = H$ und $j = F$ bzw. Cl werden starke Abweichungen beobachtet, die vielleicht auf die bei diesen Substituentenkombinationen zu erwartenden Abweichungen von der Tetraedersymmetrie der Si-Hybridorbitale zurückzuführen sind⁴. Damit ist prinzipiell die theoretische Bedeutung der Wechselwirkungsparameter gezeigt und zugleich die Möglichkeit gegeben, diese für andere Substituentenkombinationen näherungsweise zu berechnen.

Die Beobachtung, daß bei F- und O-Substituenten das einfache Wechselwirkungsschema schlechter zur Beschreibung der ²⁹Si-chemischen Verschiebung geeignet ist⁷, kann im Rahmen der hier abgeleiteten theoretischen Interpretation verstanden werden. Näherungen, die bei der Ableitung der Gln. (7) und (8) unumgänglich waren, führen bei stark elektronegativen Substituenten zu größeren Abweichungen (höhere Potenzen von $(1 - h_i)$ dürfen nicht mehr vernachlässigt werden).

¹ K. B. HUNTER u. L. W. REEVES, Can. J. Chem. **45**, 1399 [1968].

² G. ENGELHARDT, R. RADEGLIA, H. JANCKE, E. LIPPMAA u. M. MÄGI, Org. Magn. Resonance **5**, 561 [1973].

³ R. RADEGLIA, Z. Phys. Chem. (Leipzig) **256**, 453 [1975].

⁴ R. WOLFF u. R. RADEGLIA, Z. Phys. Chem. (Leipzig) **257**, 181 [1976].

⁵ F. F. ROELANDT, D. F. VAN DE VONDEL, E. V. VAN DEN BERGHE, J. Organomet. Chem. **94**, 377 [1975].

⁶ R. WOLFF u. R. RADEGLIA, Z. Phys. Chem. (Leipzig) **258**, 145 [1977]; Org. Magn. Resonance **9**, 64 [1977].

⁷ M. VONGEHR u. H. C. MARSMANN, Z. Naturforsch. **31b**, 1423 [1976].

⁸ C. A. COULSON, Die chemische Bindung, S. 133, S. Hirzel-Verlag, Stuttgart 1969.